LIFE GROS

- **Producto con Aminoácidos, Materia orgánica y esteroides naturales.**

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres: 9% = (10% m/v)
Nitrógeno (N) total: 2,8%
Nitrógeno (N) orgánico: 2,8%
Materia orgánica: 20%

CARACTERISTICAS GENERALES

LIFE GROS es un abono especial que contiene una cantidad adecuada de Aminoácidos y Materia orgánica, para su uso vía foliar o radicular. Los aminoácidos de **LIFE GROS** son absorbidos directamente por la planta y evitan a ésta el trabajo de sintetizarlos. Este ahorro energético se traduce en una respuesta inmediata de la planta para aprovechar todo su potencial genético. Los aminoácidos son absorbidos rápidamente por el cultivo y transportados a los órganos de mayor actividad.

Además, **LIFE GROS** contiene un tipo de "**Esteroides Vegetales**", que son hormonas naturales que contienen la mayoría de las plantas y que incrementan la síntesis de ARN, ADN y otras proteínas por la planta y al mismo tiempo promueven y estimulan la división celular, aumentando la elongación de tallos y frutos. Es por ello que **LIFE GROS** está indicado para incrementar el cuajado y mejorar el engorde del fruto en todo tipo de cultivos, en especial en cítricos, frutales de hueso y hortalizas de fruto. **LIFE-GROS** reduce en cítricos, la caída fisiológica de frutos (porgá) e incrementa su calibre, con resultados similares a los de los fitorreguladores de síntesis que se utilizan habitualmente.

RECOMENDACIONES DE EMPLEO

Dosis y modo de empleo
Vía foliar: Diluir en agua y tratar a la dosis de 100 - 200 c.c./hl.
Vía radicular: en general, para hortalizas, de 2 a 3 litros/ha y aplicación, hasta alcanzar 6-9 litros/ha y cultivo.

Época de aplicación
Cítricos: efectuar una primera aplicación foliar con LIFE-GROS junto al tratamiento para el cuajado del fruto y luego otra después de la "porgá" o caída natural del fruto, para mejorar el engorde del fruto.
Frutales de hueso: efectuar 2 tratamientos, uno a la caída de pétalos y otro a los 30 días.
Hortícolas: efectuar tratamientos a intervalos de 15 a 20 días, para inducir el cuajado del fruto.

Presentación
Botellas de 1 litro y bidones de 5 litros.